

K5. TAPASZTALTA-E, HOGY AZ ÖNÖK KÖZÖTTI INTIMITÁS A PAH DIAGNOSZTIZÁLÁSÁT KÖVETŐEN CSÖKKENT?

KITÖLTÉS DÁTUMA: _____

Ha igen, kit tart megfelelő személynek arra, hogy ezt megbeszélje vele? Több válasz is lehetséges, kérjük jelölje be az összeset, amit megfelelőnek tart*

- ☐ PAH specialista
- ☐ Más szakember
- ☐ Háziorvos
- ☐ Tanácsadó/ápoló
- ☐ Betegszervezet
- ☐ Más PAH beteg
- ☐ Más jelentős személy/élettárs
- ☐ Család/Barátok
- ☐ Más gondozó
- ☐ Egyéb.....
- ☐ Nem igénylem/nem szükséges

INTIMITÁS	IGEN	NEM
Kevésbé érzem magam közel a partneremhez	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Küzdök azért, hogy a vonzalmamat más módon kifejezzem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Úgy érzem, hogy partnerem inkább gondozót lát bennem, mint partnert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nem érzem, hogy csökkent volna a szexuális aktivitásunk és egyébként ezt a témát megbeszéltük	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Szeretném más módját kimutatni vonzódásomnak (csók, ölelés, stb.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Egyéb ok:		

A PAH HATÁSA A MINDENNAPOKRA: EREDMÉNYEK EGY NEMZETKÖZI FELMÉRÉSBŐL

A 2011-ben végzett, nemzetközi felmérés célja az volt, hogy többet megtudjunk arról, hogy a PAH a fizikai tüneteken túl, hogyan befolyásolja a betegek és gondozóik életének egyéb területeit. Amint az 1. ábra mutatja, a felmérés 4 fő területet tárt fel; az ezekkel kapcsolatos fő megállapításokat a következő oldalak tartalmazzák.

1. ábra / Felmérés által feltárt területek



* Amennyiben nem tudja, hogy hozzáférhető-e Ön számára javasolt szakmai segítség, vegye fel a kapcsolatot háziorvosával és kérdezze meg, hogy ki lehet a megfelelő személy, akivel ezt megbeszélheti.